

Układ krwiotwórczy

BADANIE PRZEDMIOTOWE

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
WUM

lek. Olga Rostkowska


Niedokrwistość – WYWIAD I BADANIE

Niespecyficzne objawy ogólne:

- Zmęczenie
- Bóle głowy
- Dusznosc
- Nasilenie objawów innych współistniejących schorzeń, np. dusznicy bolesnej

Niespecyficzne objawy w badaniu fizykalnym:

- Bładość skóry (z odcieniem słomkowym – **megaloblastyczna**)
- Bładość śluzówek
- Przyspieszony oddech (tachypnoe)
- Przyspieszenie pracy serca (tachykardia)
- Obniżone ciśnienie tętnicze
- Szmer skurczowy w okolicy koniuszka serca
- Hipotensja ortostatyczna
- Język – zmiana koloru, powierzchni, zanik brodawek



Niedokrwistość – WYWIAD I BADANIE

Niespecyficzne objawy w badaniu fizykalnym:

Bladość skóry (z odcieniem słomkowym – B12 def.)

Bladość śluzówek

Przyspieszony oddech (tachypnoe)


Przyspieszenie pracy serca (tachykardia)

Obniżone ciśnienie tętnicze

Szmer skurczowy w okolicy koniuszka serca

Hipotensja ortostatyczna


Język – zmiana koloru, powierzchni, zanik brodawek



Niedokrwistość – BADANIE inne



anemia złośliwa – niedobór B12



gładki język – niedobór Fe



bladość śluzówek w anemii różnego pochodzenia



Koilonychia z niedoboru Fe



Zespół Plummera-Vinsona
– anemia z niedoboru Fe



Bladość paznokci w przewlekłej
niedokrwistości

Powiększenie węzłów chłonnych - BADANIE


Węzły chłonne:

Szybkość powiększania się węzłów chłonnych i stopień ich powiększenia, bolesność

Objawy towarzyszące:

utrata masy ciała, nocne poty, świąd, gorączki, zmęczenie

CHŁONIAKI!





Komórki Reed-Sternberga



Powiększenie węzłów chłonnych - BADANIE

CHŁONIAKI!



Lokalizacja: miejscowe, uogólnione




Wielkość (mm/cm): XXXX

Konsystencja: twarde, miękkie, chęłboczjące


Przesuwalność względem podłoża: przesuwalne, nieprzesuwalne

Jama brzuszna - BADANIE


- Powiększenie wątroby i śledziony
- Opór patologiczny (wyczuwalny „obiekt” w jamie brzusznej)




CHŁONIAKI!



Jama brzuszna - WODOBRZUSZE



Śledziona - BADANIE



Pacjenta należy poprosić o wykonanie głębokiego wdechu przez usta; dolny brzeg śledziony jest najlepiej wyczuwalny na szczycie wdechu.


Należy umieścić lewą dłoń w okolicy dolnych żeber pacjenta i zbliżać ją w kierunku łuku żebrowego przesuwając w ten sposób śledzionę do przodu.

Jeśli śledziona jest mała, pacjenta należy ułożyć do badania na prawym boku.

Badanie palpacyjne śledziony

Oceń: ★★★★★ 5

📌 DODAJ DO PLAYLISTY 0



<https://medtube.pl/inne/filmy-medyczne/487-badanie-palpacyjne-sledziony>


Jaki to objaw?



Zespół żyły głównej górnej

Zespół objawów spowodowanych znacznym utrudnieniem lub zamknięciem przepływu krwi przez żyłę główną górną. **Spotykany najczęściej w przebiegu zmian rozrostowych w obrębie śródpiersia.**


CHŁONIAKI!



Białaczki

Objawy białaczki ze względu na fakt, że nie są charakterystyczne i zwykle rozwijają się stopniowo, często w początkowym etapie są zupełnie bagatelizowane przez chorego.

Zdarza się, że przypadkowe rozpoznanie tej choroby opiera się na rutynowo wykonanej **morfologii krwi obwodowej**.




Białaczki - BADANIE

Białaczki ostre objawiają się zazwyczaj:


- gorączką **typu septycznego**
- bladością powłok
- dolegliwościami typu anginowego z nalotami szarobrunatnymi i trudno gojącymi się owrzodzeniami na przerostych zazwyczaj migdałkach, błonie śluzowej jamy ustnej lub języku
- skłonnością do tworzenia się wybroczyn śródskórnych, mniejszych lub większych sińców oraz samoistnych krwotoków (np. z nosa).

Białaczki przewlekłe charakteryzują się objawami podobnymi, ale o mniej agresywnym przebiegu:

- narastającą bladość skóry, spojówek i widocznej błony śluzowej jamy ustnej,
- postępujące, miejscowe lub uogólnione, powiększenie węzłów chłonnych
- zwiększoną skłonność do zakażeń



Common symptoms of
Leukemia



Przerost dziąseł - BADANIE



Monika Borakowska¹, Renata Górka¹, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek², Maciej Nowak¹


Przerost dziąseł u pacjentki z przewlekłą białaczką mielomonocytową – opis przypadku

Chronic myelomonocytic leukemia with gingival hyperplasia – a case report

¹ z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górka

² z Zakładu i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie

Haemophilia




Stawy




Artropatia u pacjentów z hemofilią

W zależności, jakiego czynnika brakuje, wyróżnia się **hemofilię A** (niedobór czynnika VIII), **hemofilię B** (niedobór czynnika IX) lub **hemofilię C** (niedobór czynnika XI).

**Jakie objawy mogą
towarzyszyć
chorobom krwi?**




**Jakie objawy mogą
towarzyszyć
chorobom krwi?**



W materiałach w MS
Teams znajdą
Państwo ten schemat
do wypełnienia w
formacie Word.
Proszę każdego o
przesłanie go do mnie
w wiadomości priv w
MS Teams (format
dowolny).

→ Olga Rostkowska



KONIEC

olga.rostkowska@wum.edu.pl

